

予防接種

予防接種の必要性をよく理解し、感染症から子どもを守るためにも、子どもの体調のよい時に、予防接種を受けておきましょう。

予防接種を受ける時期

- 予防接種には年齢や回数について決まりがあるため、正しい知識を持って、計画的に受けることが大切です。
- 健康のしおりや高崎市ホームページ等でも詳しくお知らせしておりますので、よく確認しておきましょう。


予防接種を受ける前に

- 予防接種はお子さんの体調が良い時に受けましょう。
- 心配のあるときは、かかりつけの医師に相談してください。

予防接種を受ける時に

- 母子健康手帳、予診票、健康保険証、福祉医療費受給資格者証を忘れずに持って行きましょう。
- 受ける予定の予防接種について、通知やパンフレット「予防接種と子どもの健康」をよく読み、必要性や副反応について理解し、わからないことは接種を受ける前に医師に質問しましょう。
- 医療機関へは保護者がつれて行きましょう。
- 予診票は医師への大切な情報ですので責任をもって記入するようにしましょう。

次の場合には、予防接種が受けられないことがあります



- 次のような場合には予防接種を受けることができません。
 - ① 明らかに発熱している人(通常37.5℃以上)
 - ② 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
 - ③ その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことがある人
 - *「アナフィラキシー」とは、通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。
 - ④ その他、予防接種を行うことが不適当な状態にあると医師が判断した人
- このほかにも、気がかりなことがありましたら、お子さんの健康状態をよく知っている、かかりつけの医師などに相談してください。

予防接種を受けた後に

- 予防接種を受けたあと30分間は医療機関でお子さんの様子を観察しましょう。
- 医療機関で配布する「接種後の注意」を必ずお読みください。
- 接種後に心配なことがありましたら、早めに医師に相談してください。



問い合わせ

住んでいる地域の窓口へ

高崎地域	▶ 高崎市保健所保健予防課 027-381-6112
箕郷地域	▶ 箕郷保健センター 027-371-9060
群馬地域	▶ 群馬保健センター 027-373-2764
新町地域	▶ 新町保健センター 0274-42-1241
榛名 倉淵地域	▶ 榛名・倉淵保健センター 027-374-4700
吉井地域	▶ 吉井保健センター 027-387-1201

予防接種の概要 (平成29年3月1日現在)

定期予防接種 (全額公費負担)



種類	対象年齢	接種方法・回数
B型肝炎 Hepatitis B	3か月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳6か月 2か月 標準的な接種期間	<ul style="list-style-type: none"> 1歳に至るまでの間に3回接種します。 標準的な接種期間は、生後2～9か月に達するまでです。 27日以上あけて2回、1回目から139日以上あけて1回の計3回接種します。
ヒブ Hib	3か月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳6か月 2か月 5歳に至るまで	<ul style="list-style-type: none"> 標準的な接種 (生後2～7か月に至るまでに接種を開始した場合) 初回免疫は4～8週までの間隔で3回接種します。 追加免疫は初回の3回目終了後7～13か月までの間隔をおいて1回接種します。 ※ 上記以外の月齢で接種を開始した場合は回数が異なります。
小児用肺炎球菌 PCV13	3か月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳6か月 2か月 5歳に至るまで	<ul style="list-style-type: none"> 標準的な接種 (生後2～7か月に至るまでに接種を開始した場合) 初回免疫は4週以上の間隔で3回接種します。 追加免疫は初回の3回目終了後60日以上の間隔をおいた後、1歳を過ぎてから1回接種します。 ※ 上記以外の月齢で接種を開始した場合は回数が異なります。
四種混合 (ジフテリア・百日せき 破傷風・ポリオ) DPT-IPV	3か月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳6か月 1期 1期初回標準的な接種期間	<ul style="list-style-type: none"> 1期初回は3～8週の間隔で3回接種します。 標準的な接種期間は、生後3～12か月に達するまでです。 1期追加は、1期初回の3回目終了後、1年～一年半の間に1回接種します。
BCG (結核)	3か月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳6か月	<ul style="list-style-type: none"> 注射ではなくスタンプ式(管針法)。 1歳に至るまでの間に1回接種します。 標準的な接種期間は、生後5～8か月に達するまでです。
麻しん(はしか) 風しん 混合 MR	3か月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳6か月 1期 2期	<ul style="list-style-type: none"> 皮下注射。 1期は、満1歳～2歳に至るまでに1回接種します。 1歳になったら出来るだけ早めに受けましょう 2期は小学校入学前の1年間に1回接種します。
水痘 Varicella	3か月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳6か月 1回目の標準的な接種期間	<ul style="list-style-type: none"> 標準的には満1歳～1歳3か月に達するまでに1回目を接種します。 2回目は1回目終了後6か月～1年未満までの間隔をおいて3歳に至るまでに接種します。
日本脳炎 Encephalitis	3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 1期 2期 標準的な接種期間	<ul style="list-style-type: none"> 1期初回は1～4週間隔で2回、1期追加は1期初回2回目接種終了後からおおむね1年後に接種します。 標準的には、1期初回が3歳、1期追加が4歳です。 2期は、満9歳～13歳未満で1回接種します。 標準的な接種期間は、満9歳～10歳に達するまでです。
二種混合 (ジフテリア・破傷風) DT	7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 標準的な接種期間	<ul style="list-style-type: none"> 満11歳～13歳未満で1回接種します。 標準的な接種期間は、満11歳～12歳に達するまでです。

●「〇か月に至るまで」、「〇か月に達するまで」とは、〇か月になる前日までです。



任意予防接種 (一部公費負担)

種類	対象年齢	自己負担額	助成回数	接種場所
おたふくかぜ	満1歳～5歳未満	接種料金から 3,000円を引いた額	1回	市内の実施医療機関
ロタリックス (1価)	生後6週～24週未満	接種料金から 6,000円を引いた額	2回	市内の実施医療機関
ロタテック (5価)	生後6週～32週未満	接種料金から 4,000円を引いた額	3回	市内の実施医療機関

※ロタウイルスワクチンは、2種類の製品があります。